INSELGRUPPE | BeSiC Berner Simulations- & CPR-Zentrum

GUIDELINES 2025 EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

Neugeborenen-Erstbeurteilung

Beurteilen
Führen Sie während der **DCC** eine sanfte **taktile Stimulation** durch.

↓

Einstufen

↓

Intervenieren

↓

Neu beurteilen

Atmung: regelmäßig
HF: > 100 min^{-1}
Stimulation: gute Reaktion
Tonus: gut

↓

Zufriedenstellend

↓

Routineversorgung
Bleibt bei der Mutter

↓

Regelmäßige Beobachtung

Atmung: insuffizient
HF: 60–100 min^{-1}
Stimulation: schwache Reaktion
Tonus: reduziert

↓

Unvollständiger Anpassung[a]

↓

Anpassung unterstützen
Stimulation, Beatmung

↓

Kontinuierliches Monitoring erwägen[c]

Atmung: keine
HF: < 60 min^{-1}
Stimulation: keine Reaktion
Tonus: schlaff

↓

Keine Anpassung[b]

↓

Starte die Reanimation
Beatmung
Rufe Hilfe

↓

Kontinuierliches Monitoring starten[c]

---

a) Eine langsame HF kann auf eine Hypoxie hinweisen, sodass Atemwege und Atmung therapiert werden müssen. Eine Beatumung führt wahrscheinlich zu einer höheren Herzfrequenz und einer besseren Anpassung.
b) Die HF deutet auf eine erhebliche Hypoxie hin, sodass dringend eine Therapie der Atemwege und der Atmung erforderlich ist.
c) SpO2 +/- EKG.

DCC = Verzögertes Abnabeln
HF = Herzfrequenz

© ERC 2025

0392299_Mp.mxd

0392299_Plakat_ERC_ALS_A0_Quer.indd 4 05.06.26 10:35